BIO-IMPROVER

Plant Growth Promoter

CONTENIDO

- 1 LITRO
- 10 LITROS
- 20 LITROS

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Extracto natural de ***Cocos nucifera***	72,00%
Carbón Orgánico Total	12,00%
pH	4,5 - 5,5
Densidad	1.150 g/lt
Solubilidad	100%

METALES PESADOS

Pb	<1,00 ppm	Cd	<1,0 ppm
As	5-10 ppm	Hg	<1,0 ppm

INFORMACIÓN GENERAL

BIO-IMPROVER es un bioestimulante basado en extractos vegetales derivados de ***Cocos nucifera***, formulados para aplicación foliar.

BIO-IMPROVER es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes comerciales. Para mayor seguridad, cuando use BIO-IMPROVER en mezcla con otros productos, siempre haga una prueba de compatibilidad antes de proceder con volúmenes mayores.

FABRICADO POR:

NUTECH
Nutrient Technologies, L.L.C.
5415 Lake Howell Rd. Suite 177 Winter Park, FL 32792. USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

MBL

MBL FARM SPA
Camino San Miguel s/n, Parcela 2-2, Colina, Santiago.
www.mbl.cl

BIO-IMPROVER
Plant Growth Promoter

RECOMENDACIONES DE USO

Bio-Improver puede usarse en cualquier cultivo. Se debe aplicar vía foliar, mezclado con suficiente agua para asegurar una buena cobertura del follaje.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
Vides sin semillas	1,5 - 3,0 L/ha	Bayas de 3-4 mm y repetir con bayas de 5-6 mm	Cuando sea dirigido a todo el follaje
	350 - 500 cc/hL	Bayas de 4-8 mm	Cuando sea dirigido a los racimos
Vid cv. Red Globe	1,5 - 3,0 L/ha(1) 350 - 750 cc/hL(2)	Bayas recién cuajadas (post "shatter") dirigido a todo el follaje(1) y repetir con bayas de 12-14 mm dirigido a los racimos(2)	Se recomiendan 2 aplicaciones, la primera a todo el follaje y la segunda dirigida a los racimos
Cerezos	2,0 L/ha	Inicio de floración, plena flor, caída de pétalos y en frutos pre-color pajizo.	Dirigido a todo el follaje, con nebulizadora convencional.
Arándanos	1,0 - 2,0 L/ha	A partir de frutos recién cuajados, cada 7-10 días	Realizar 2-3 aplicaciones, con mojamiento acorde al tamaño de las plantas
Carozos en general	1,0 - 2,0 L/ha	Plena flor y repetir a los 7-14 días	Realizar 2 aplicaciones, con mojamiento acorde al tamaño de los árboles
Cítricos	1,5 - 3,0 L/ha	Plena flor y en caída de pétalos	Realizar 2 aplicaciones / temporada
Frutillas	0,5 L/ha	Inicio de floración y repetir cada 15-20 días	Realizar 3-4 aplicaciones / temporada
Hortalizas de fruto	0,5 L/ha	Inicio de floración y repetir a los 15-20 días	Realizar 2 a 3 aplicaciones / temporada

(1) Dosis para aplicaciones dirigidas a todo el follaje. | (2) Dosis para aplicaciones dirigidas a los racimos.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Nocivo por ingestión. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de contacto, lave inmediatamente la piel o los ojos con agua durante al menos 15 minutos.

AVISO

Las declaraciones en esta etiqueta se consideran verdaderas y precisas, pero debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el fabricante no hace, ni autoriza a ningún agente o representante para que haga cualquier garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material o su uso. Ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ninguna manera por cualquier daño personal o daño a la propiedad o pérdida resultante al comprador o a otras personas por el manejo, almacenaje o uso de este material, de modo no acorde con las instrucciones de esta etiqueta. El comprador asume todo el riesgo y la responsabilidad que resulte del manejo inadecuado, almacenaje o uso del mismo y acepta que está dispuesto a utilizar este material bajo estas condiciones.